
* Res. 4 *
* Phyt. *
* O *
* m *

Phyt. 0^m₌

Abbildung

40

ABBILDUNGEN
DER
SCHWÄMME.

ERSTES HEFT.



TAF. I—X.

1790.

Um die Wünsche verschiedener Naturliebhaber zu erfüllen: von denen in dem Nomenclator Fungorum aufgenommenen Schwämmen oder auch ohne diesen, genaue Abbildungen der bestimmtesten Arten zu besitzen, ohne den beträchtlichen Kostenaufwand auf solche, theils ausländische, theils einheimische Werke in denen Schwämme vorgestellt werden, machen zu dürfen, erscheinen hier die ersten zehn Tafeln der Blätter-schwämme; vierzig solche Tafeln oder vier Hefte werden mit einem allgemeinen Verzeichniß und Titel zu einem ganzen Band versehen. Nur von ausländischen Arten und sehr guten Abbildungen werden getreue Copien gefertigt, einheimische und schlecht oder mittelmäßig vorgestellte Schwämme sollen in eigenen Gemälden nach der Natur aufgenommen werden, um Liebhabern dieser Gewächse, die sich nicht so wie andre Pflanzen aufbewahren lassen, noch weniger mit Sicherheit ohne getreue Abbildungen können bestimmt werden, eine vollständige Sammlung von Schwämmen um einen sehr mäßigen Preis in die Hände zu liefern.

21/15

VERZEICHNIS DER SCHWÄMME

IN DIESEM HEFT.

(Um die willkürliche Anordnung der Tafeln nicht zu bindern, hat man ihre Bezeichnung weggelassen.)

- 1 AGARICUS TRILOBUS, stipitatus, pileo fulvo, margine striato, lamellis omnibus aequalibus, stipite basi volvato *Bolt. Fung. Tab. 38.* Nomenclat. Fung. p. 32.
 - 2 AGARICUS POMPOSUS, stipitatus, pileo rotundo coccineo, lamellis olivaceis, stipite inaequali *Bolt. Fung. Tab. 5.* Nom. Fung. 82.
 - 3 AGARICUS SERRATUS, stipitatus, pileo globofo purpureo, lamellis croceis serratis *Bolt. Fung. Tab. 14.* Nom. Fung. 84.
 - 4 AGARICUS CINNAMOMEUS, stipitatus, pileo convexo rufo, lamellis flavescentibus, stipite longo flavo *Bolt. Fung. Tab. 22.* Nom. Fung. 84.
 - 5 AGARICUS ELEPHANTINUS, stipitatus, pileo crasso hemisphaerico subluteo viscido, lamellis trifidis crassis fragilibus, subalbidis, stipite albo crasso spongioso *Bolt. Fung. Tab. 28.* Nom. Fung. 85.
 - 6 AGARICUS RIGIDUS, stipitatus, pileo fusco crasso, margine undulato rimoso, lamellis bifidis crassis pallidis, stipite longo fusco inaequali *Bolt. Fung. Tab. 43.* Nom. Fung. 97.
 - 7 AGARICUS CASTANEUS, stipitatus, pileo subconico castaneo, lamellis trifidis, stipite albo fistuloso, cortina alba *Bolt. Fung. Tab. 10.* Nom. Fung. 155.
 - 8 AGARICUS RUBENS, stipitatus, pileo convexo, lamellis trifidis profundis, stipite longo, tota planta ruberrima *Bolt. Fung. Tab. 36.* Nom. Fung. 159.
 - 9 AGARICUS FISSUS, stipitatus, pileo conico, margine undulato, striato, lamellis trifidis aurantio carneis, stipite fisso, longo, minute striato *Bolt. Fung. Tab. 35.* Nom. Fung. 158.
 - 10 AGARICUS CAMPANULATUS, stipitatus, pileo campanulato striato pellucido, lamellis adscendentibus, stipite nudo *Bolt. Fung. Tab. 31.* Nom. Fung. 244.
-

VERZEICHNIS DER SCHWÄMME

IN DIESEM HEFT.

(Um die nützliche Anwendung der Schwämme zu sehen, siehe die Beschreibung in Heft 1.)

- Agaricus trichopus*, stipitatus, pileo fulvo, margine fibrato, lamellis omnibus separatis, stipite
brevi robusto. Tab. I. Fig. 28. Nomenclatur. Fig. 9. 2a.
- Agaricus tomentosus*, stipitatus, pileo tomentoso coccineo, lamellis effusis, stipite inaequali. Tab. I. Fig.
29. 2a. Nomenclatur. Fig. 10. 2a.
- Agaricus sordidus*, stipitatus, pileo globoso porporeo, lamellis crebris fuscis. Tab. I. Fig. 30.
Nomenclatur. Fig. 11.
- Agaricus cinnamomeus*, stipitatus, pileo convexo nullo, lamellis faveolatis, stipite longo fuso.
Tab. I. Fig. 31. 2a. Nomenclatur. Fig. 12.
- Agaricus erythranthus*, stipitatus, pileo crasso hemisphaerico fibrato viscido, lamellis nigris
crassis. Tab. I. Fig. 32. 2a. Nomenclatur. Fig. 13.
- Agaricus niger*, stipitatus, pileo crasso, margine undulato rimato, lamellis fibratis crassis
glaucis, stipite longo fuso inaequali. Tab. I. Fig. 33. Nomenclatur. Fig. 14.
- Agaricus castaneus*, stipitatus, pileo subgloboso castaneo, lamellis nigris, stipite albo fibrato.
Tab. I. Fig. 34. 2a. Nomenclatur. Fig. 15.
- Agaricus roseus*, stipitatus, pileo convexo, lamellis nigris profusis, stipite longo, tota planta
ruberrima. Tab. I. Fig. 35. Nomenclatur. Fig. 16.
- Agaricus viscosus*, stipitatus, pileo crasso, margine undulato, fibrato, lamellis nigris mucronatis
stipite albo, longo, mucrone fibrato. Tab. I. Fig. 36. Nomenclatur. Fig. 17.
- Agaricus campanulatus*, stipitatus, pileo campanulato fibrato pelliculoso, lamellis adpressis
stipite nullo. Tab. I. Fig. 37. Nomenclatur. Fig. 18.

Copy 254 (4)

ABBILDUNGEN

DER

S C H W Ä M M E.

ZWEYTES HEFT.

Taf. XI - XX.

1791.

MEMORANDUM

2. C. H. W. A. M. M. D.

THE OFFICE

IN THE

1071

VERZEICHNIS DER SCHWÄMME

DES ZWEYTEN HEFTS.

- 11 **AGARICUS PULVINATUS**, (kissenförmiger Blätterschw.) stipitatus, pileo pulvinato subviscido, margine integro striato, lamellis minoribus basi truncatis, volva lata, lobata permanente, velo nullo *Bolt.* t. 49. Nom. Cont. p. 5.
 - 12 **AGARICUS LATUS**, (breiter Blätterschw.) stipitatus, pileo convexo fusco, lamellis trifidis latissimis, carneo pallidis *Bolt.* Fung. t. 5. Nom. Fung. p. 82.
 - 13 **AGARICUS LARICINUS**, (walzenförmiger Blätterschw.) stipitatus, pileo fulvo angusto convexo, lamellis angustis crassis, stipite ramoso crasso spongioso fusco *Bolt.* Fung. t. 19. Nom. Fung. p. 97.
 - 14 **AGARICUS INFUNDIBULIFORMIS**, (trichterförmiger Blätterschw.) stipitatus, pileo infundibulo murino, lamellis sessilibus ramosis griseis *Bolt.* Fung. t. 34. Nom. p. 148.
 - 15 **AGARICUS FIMBRIATUS**, (kohlähnlicher Blätterschw.) stipitatus, pileo infundibuliformi margine elegantissime fimbriato lobato, tenui albo, semitransparenti, lamellis trifidis longissimis angustissimis pellucidis, stipite gracili brevi *Bolt.* Fung. t. 61. Nom. Cont. p. 49. (Agar. Brassica).
 - 16 **AGARICUS PERONATUS**, (gestiefelter Blätterschw.) stipitatus, pileo hemisphaerico subpellucido, lamellis trifidis paucis angustis pellucidis stipite parte superiori glabro, inferiori lanuginoso, basi arcuato *Bolt.* Fung. t. 58. Nom. Cont. I. p. 48.
 - 17 **AGARICUS TENUIS**, (fadenförmiger Blätterschw.) stipitatus, pileo campanulato membranaceo, lamellis trifidis albidis pellucidis, stipite longissimo pellucido albido *Bolt.* t. 37. Nom. p. 219.
 - 18 **AGARICUS PLUMOSUS**, (befiederter Blätterschw.) stipitatus, pileo hemisphaerico plumoso murino, lamellis trifidis albidis stipite longo plumoso *Bolt.* t. 33. Nom. p. 157.
 - 19 **AGARICUS FASCICULARIS**, (büschelförmiger Blätterschw.) stipitatus, pileo convexo luteo, lamellis virescentibus, stipite flavo *Bolt.* Fung. t. 29. Nom. p. 228.
 - 20 **AGARICUS PULLATUS**, (tieffschwarzer Blätterschw.) stipitatus, pileo campanulato plicato atro, stipite longo venicoso albido *Bolt.* Fung. t. 20. Nom. p. 243.
-

Phys. 224 (4)

ABBILDUNGEN

DER

SCHWÄMME.

DRITTES HEFT.

*minje nach Kayser
nicht w/ist*

Taf. XXI - XXX.

1793.

N A C H R I C H T.

Die Veranlassung zu diesen Abbildungen der Schwämme ist bekanntlich keine andere, als den Liebhabern einer so zahlreichen Familie, die Kenntniss davon durch sichere, oder vorzüglich auszeichnende Arten zu erleichtern, und den beträchtlichen Kostenaufwand, für große Werke, worinnen diese, unter einer Menge ungewisser Arten zerstreut sind, zu ersparen. In der Absicht werden aus den kostbaren Schriften eines CURTIS, BOLTON, BULLIARD und andern, nur die gewissesten Arten ausgehoben, oder auch neue und nicht auf das vollkommenste vorgestellte Arten, in getreuen nach der Natur verfertigten Abbildungen hier aufgenommen. Zu letztern gehören gegenwärtige Tafeln, welche größtentheils neue von Herrn PERSOON zu Göttingen gesammelte und zu diesem Entzweck mitgetheilte Arten, der Natur auf das getreueste von der Hand eines geschickten Mahlers nachgebildet, enthalten. Mit dem vierten Heft wird zugleich eine ausführlichere Beschreibung und critische Synonymie aller vorhergegangenen Arten erscheinen, und dieser Band unter einen allgemeinen Tittel geschlossen, so wie die unbezieferten Tafeln selbst, nach einer jeden willkürlicher Ordnung eingelegt werden.

VERZEICHNIS DER SCHWÄMME

DES DRITTEN HEFTS.

- 21 **AGARICUS ASTER**, (ranher Blätterschwamm) stipitatus, pileo carnosio umbonato, squamis acutis erectis strigosis, sordide ochraceis; lamellis candidis; stipite annulato bulbofo fibrilloso.
- 22 **AGARICUS GUTTATUS**, (betropfter Blätterschw.) stipitatus, pileo carnosio obtuse umbonato, pallide lateritio; lamellis pallescente albidis; stipite longo subbulbofo, apice annuloque atroviridi guttato.
- 23 **AGARICUS MACROSPORUS**, (langstieliger Blätterschw.) stipitatus, pileo carnosio, convexo, piloso-squamoso rufescente; lamellis cervino-ferrugineis; stipite longissimo squamoso, basi et superne albo-tomentoso; velo fugaci. (Lamellae pars lente vitrea aucta).
- 24 **AGARICUS FLAVO-VIRENS**, (gelblichgrüner Blätterschw.) stipitatus, pileo carnosio subumbonato flavido; squamis sparsis nigricantibus; lamellis subconfertis stipiteque solido sulphureis.
- 25 **AGARICUS CONCENTRICUS**, (concentrischer Blätterschw.) stipitatus, pileo subcarnoso albido; umbone squamulisque badiis; lamellis remotis, stipiteque longissimo pallescente albidis.
- 26 **AGARICUS EQUINUS**, (auf Pferdemist wachsender Blätterschw.) stipitatus, pileo subcarnoso, subhemisphaerico pallescente umbrino; lamellis planis rectis, e cinereo nigroque variegatis; stipite pulverulento squamuloso.
- 27 **AGARICUS DENTATUS**, (gezahnter Blätterschw.) gregarius, stipitatus, pileo convexo umbilicato integro ochraceo-fuliginoso; lamellis dentatis cinereo-albidis; stipite incrassato subcompresso.
(Var. stipite sublaterali).

28

AGARICUS COCHLEATUS, (schneckenförmig gedrehter Blatterschw.) stipitatus, caespitosus, pileo infundibuliformi contorto ochraceo-fuligineo; lamellis subserratis decurrentibus fordide albidis; stipite solido basi connato.

29

AGARICUS OCHRACEUS, (ocherfarbiger Blatterschw.) imbricatus, pileo carnosio dimidiato ochraceo; lamellis confertis argillaceis; stipite brevissimo laterali albo-tomentoso. Agar. ochraceus Wulf. Nomencl. Fung. p. 126.

30

AGARICUS SEROTINUS, (späth reifer Blatterschw.) imbricatus, pileo carnosio dimidiato olivaceo; lamellis confertis subramosis pallidis; stipite laterali crasso squamuloso-flavido.



Agaricus trilobus Bolt.

J. Sturm. sc.

Ananistopha vag

Prächtiger Blatterschwamm.



Agaricus pomposus Bolt.
No. 81.

J. B. Klinger sc. Hb.

Sageförmiger Blatterschwamm.



Agaricus serratus Bolt
No. 84.

J G Klinger fec. Nor.



Agaricus cinamomeus

I. G. Klinger sc. Nor.



Steifer Blätterschwamm.



Agaricus rigidus Bolt
No. 104.

96 Klingen se Nör.



Agaricus castaneus Bolt.

J. G. Klinger sc. Nor

Durchsichtig rother Blatterschwamm.



Agaricus rubens Bolt

No. 200.

J. G. Alinger fec. Nor.



Agaricus fissus Bolt.



Agaricus campanulatus Bole.

G. Klinger sc. Nor.



Agaricus pulvinatus Bolt.



Agaricus latus Bolt.



Agaricus laricinus Bolt.

Armsch mellea




Agaricus infundibuliformis Bolt.



Agaricus Simbriatus Pelt.



Agaricus peronatus Bolt.



Agaricus tenuis Bolt.



Agaricus plumosus Bolt.



Agaricus fascicularis Bull.




Agaricus pullatus Bolt.



Agaricus asper Pers.

Lep. acutesquamose



Agaricus guttatus Pers.

Am. solitaria



Agaricus macrounes Perfr.





Agaricus flavo-virens Pers.



Agaricus concentricus Pers.



Agaricus equinus Pers.




Agaricus dentatus Pers.

Lentris cochleatus



Agaricus cochleatus Pers.




Agaricus ochraceus Wulfen


Agaricus 1793





Agaricus serotinus Pers.



Beer





Hoffmann, Georg Franz

Abbildungen der Schwämme [Mit 30 illum. Kupfern]

[S.l.] 1790 - 1793

Res/4 Phyt. 0 m

urn:nbn:de:bvb:12-bsb00106050-6

VD18 14783207-001